

體檢表數值異常項目與風險等級參考對照表		
級別	項目	建議
高度	<p>一、體檢結果顯示有明顯且具危險性之異常狀態，須立即回診確定病症或立即施予適當治療，以維護個人及團體健康。</p> <p>二、具「腦部」、「心血管疾病(含 BMI ≥ 34 者)」等 2 大類疾病者。</p>	不得測驗，須立即返回醫院就診
中度	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 傳染病(肺結核、鼠疫等)。</li> <li>2. 胸部 X 光腫瘤影像。</li> <li>3. 胸部 X 光異常:有急性傳染病變化(如肺結核或肺炎)或急症變化(如氣胸)。</li> <li>4. 胸部 X 光異常(單位醫官得依異常症狀嚴重情形調降其管制級數)。</li> <li>5. 實驗室檢查： WBC ≥ 20000 ; WBC ≤ 2000 ; Hb ≤ 7mg/dL ; Hb ≥ 18.5(men), Hb ≥ 16.5(women) ; PLT ≤ 50000 ; SGOT ≥ 300 or SGPT ≥ 300 ; TG ≥ 500 mg/dL ; Blood Sugar ≥ 126 mg/dL ; 低密度脂蛋白膽固醇過高 ≥ 160 mg/dl ; VDRL (+) 。</li> <li>6. 心電圖異常: 除竇性心搏過緩(須心跳 50~60 次/分)、竇性心搏過速(須心跳 110 次/分以下)、早期再極化、一度房室傳導阻斷(房室傳導遲滯時間在 200~300 毫秒)、不完全右束傳導阻滯、竇性心律、竇性心律不整、心軸左偏、心軸右偏、逆時針旋轉、順時針旋轉等可直接體測外，其他非「正常」或「正常心律」者，均須複檢。</li> <li>7. 血壓：收縮壓 ≥ 140 mm-Hg 或舒張壓 ≥ 90 mm-Hg 。</li> <li>8. 代謝症候群(符合 3 項以上)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 腰圍過粗-男性 ≥ 90cm ; 女性 ≥ 80cm 。</li> <li>(2) 血壓 ≥ 130/85mmHg 。</li> <li>(3) 空腹血糖 ≥ 100 mg/dl 。</li> <li>(4) 高密度脂蛋白膽固醇過低：男性 &lt; 40mg/dl ; 女性 &lt; 50mg/dl 。</li> <li>(5) 三酸甘油酯過高 ≥ 150mg/dl 。</li> </ol> </li> <li>9. 理學檢查： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 心臟聽診有雜音 。</li> <li>(2) 下肢水腫, grade 1 。</li> <li>(3) 頸部淋巴腫大或甲狀腺腫大 。</li> </ol> </li> </ol>	返回醫院追蹤治療。回診後，由醫院開立回診紀錄後，始得測驗。