

消毒地點	藥劑調配方法	消毒方式	使用器具	負責人員
候審室	200ppm (0.02%) 泡製：40c. c一般市售家用漂白水(約免洗湯匙2瓢)配10公升清水(約大寶特瓶7到8瓶)，用在桌椅、手常會摸到處擦拭消毒。 500ppm (0.05%) 泡製：100c. c一般市售家用漂白水(約免洗湯匙5瓢)配10公升清水(約大寶特瓶7到8瓶)，用在地板。	先噴灑後再予清潔擦拭。	噴槍壺、護目鏡、頭罩、口罩、手套、鞋套、抹布、拖把。	法警
囚車	漂白水1%泡製：一般市售家用漂白水1瓶量加2罐市售家用漂白水空罐水量，用在車廂之消毒。	先予噴槍噴灑消毒後再以抹布及拖把擦拭。	同上	司機
法庭	同後審室之泡製方式。	對於病患接觸過及飛沫可及處之桌、椅用抹布擦拭(200ppm)，地面用500ppm藥劑清潔。	同上	庭務員
手銬	高溫高壓消毒。	高溫高壓處理。	鍋爐高壓消毒器、鐵夾。	法警
其他(自殘、嘔吐物、排泄物等遭嚴重污染)	漂白水5%，一般市售家用漂白水直接使用。	對污染源直接使用。	防護衣、護目鏡、頭罩、口罩、手套、鞋套、拖把。	該區之權責單位
注意事項	漂白水稀釋時要用冷水，因熱水會使成分分解，失去效能。經稀釋後，存放時間越長，分解量越多，殺菌能力便會降低，所以最好在24小時內用完。			

附表

※藥劑調配數據係依照台北市政府衛生局疾病管制處規定。