

附件3-藥事照護報告書

個案基本資料：

姓名		出生日期		性別： <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
電話		身分證字號		職業：
住址		身高/體重	公分	公斤

照護藥師與執業藥局資料：

藥師姓名		執業藥局	
電話		地址	
E-mail		訪視起迄時間/地點：	
藥師提出報告日期：			

項目	原因/內容/發現之問題
<input type="checkbox"/> 第 次訪視個案	1. 依追蹤計畫， <input type="checkbox"/> 於 年 月 日 時開始第一次做居家訪視。 <input type="checkbox"/> 個案不願接受照護，原因：
<input type="checkbox"/> 第 次訪視發現/解決之問題	<input type="checkbox"/> 個案最近一個月共看幾次開慢箋的醫師門診： 次，共看幾次開短期用藥的醫師門診： 次(給藥日份 ≥14為慢箋，<14天為短期用藥) <input type="checkbox"/> 共有多少項醫療問題/疾病？ 項 <input type="checkbox"/> 個案因慢性病須長期使用的處方藥有_____種，因急性病短期使用的處方藥有_____種 <input type="checkbox"/> 共使用非醫師處方的藥 種 <input type="checkbox"/> 共使用中藥 種 <input type="checkbox"/> 共使用保健食品 種 <input type="checkbox"/> 藥事人員給予用藥教育 項 <input type="checkbox"/> 協助處理/清理醫師處方的藥 種及中藥、非醫師處方的藥、保健食品共 種 <input type="checkbox"/> 將藥品整理成七日藥盒(沒有就不要勾選) <input type="checkbox"/> 發現有藥物治療相關問題 項 <input type="checkbox"/> 填寫與醫師溝通之用藥問題 張

醫師診斷	藥師訪視後發現之醫療問題與家庭環境狀況

藥師發現到的病人用藥問題(配合度/儲存/用藥技巧)、對病人(照顧者)之教育事項

(AA碼)病人用藥問題描述	(BB碼)教育事項

對醫師之建議：

病人疾病控制/追蹤療效之議題	藥師之建議
(AA碼)藥物治療問題之描述	(BB碼)藥師建議之解決辦法

本次評值病人的疾病治療效果：

醫療問題 (疾病)	目前療效 代碼	追蹤改變 情形代碼	目前療效結果之描述
1.			
2.			
3.			

追蹤上次處置或建議事項的結果

上次日期	事項 (AABB碼)	目前問題解決情形 (請附CC碼)
/		
/		
/		
/		
/		

書寫報告藥師簽名：

*疑似藥物治療問題之代碼：(AA碼)

<p>◇ 有需要增加藥物治療</p> <p>11有未治療的急性狀況或疾病 12應給予預防性藥物治療 13需合併另一藥來加強療效 14慢性病應服藥而醫師未開藥</p>	<p>◇ 藥品在體內的量可能過高</p> <p>51劑量過高 52給藥間隔太短 53治療期間過長、藥量累積 54因交互作用造成劑量過高 55病患肝腎功能不佳</p>
<p>◇ 應刪除的不需要用藥</p> <p>21此藥沒有適應症存在 22重覆用藥(同一種藥或同一藥理分類) 23此症狀不需藥物治療 24用來治療另一藥可避免的副作用 25缺乏可支持的檢驗數據 26採用非藥品處置更恰當</p>	
<p>◇ 藥品選擇不適當</p> <p>31藥品劑型不適當 32有治療禁忌 33有配伍禁忌 34病患對藥品有耐受性或抗藥性 35還有更有效、安全、方便的藥 36吃藥時間過於複雜 37可選用單一成分藥，不需用到複方藥 38從前用此處方藥品治療失敗 39不符合此適應症</p>	<p>◇ 藥品不良反應</p> <p>61藥品-藥品交互作用 62病患對此藥品過敏 63劑量調整速度太快 64對病患不安全(如疾病危險因子、懷孕、 哺乳、幼兒、老人) 65在正常劑量下，產生不期望的藥理反應 66使用不安全藥品 67病患特異體質 68不正確給藥方式</p>
<p>◇ 藥品在體內的量可能不足</p> <p>41劑量過低或血中藥品濃度不夠 42給藥間隔太長 43治療期間不足 44因交互作用造成劑量降低 45給藥方式造成藥量進入太少 46藥品儲存方式不適當</p>	<p>◇ 病人服藥配合度差</p> <p>91幾種用藥給藥時間太複雜 92服藥觀念不正確 93藥貴、不願意買 94不瞭解正確服藥方法 95常忘記服藥 96無法吞下或給藥 97應做TDM/療效監測</p>

◇編碼00其他：沒有藥物治療問題，但有教育病人正確就醫或自我照護做法。

**若有未列出之問題種類，請告知中華民國藥師公會全聯會(以下稱藥師全聯會)督導，以更新版本。

*藥事人員建議醫師用藥之溝通事項 (BB碼)

11建議開始用某藥	17建議改變治療期限
-----------	------------

12建議停用某藥	18建議改變劑型
13建議換用另一種藥品	19建議更改給藥時間/用藥方法
14建議改變劑量	21建議以BA/BE學名藥替代
15建議更改藥品數量	22向原處方醫師確認用藥
16建議改變用藥間隔	23建議生化、血液或療效監測

* 醫師之回應結果 (CC碼)

11醫師增加一藥來治療	19更改給藥時間
12停用某藥	21經討論維持原處方
13換用另一種藥物	22以BA/BE學名藥替代
14更改劑量	23醫師採用治療性取代
15更改藥物數量	24醫師開始新治療法
16更改用藥間隔/頻率	25醫師沒接受意見，問題沒有解決
17更改治療期限	26健保署不給付
18更改劑型	

**若有未列出之介入事項或醫師回應結果種類，請告知藥師全聯會，以更新版本。

* 與個案溝通內容 (BB碼)

51疾病與就醫知識/對就醫看門診之建議	58自我照顧技巧/對生活形態之建議
52用藥知識(藥名/作用/劑量/用法/用藥時間須知/警語/保存/常見副作用)	59認識開始或改變藥物治療的時機
53用藥技巧	61疾病突發時的處理步驟
54對忘記服藥之處理	62需要去門診/急診室治療的狀況
55對同時使用OTC藥/食物/保健食品之建議	63認識疾病長期控制不佳的狀況
56促進健康/預防疾病措施	64如何避免過敏原與刺激物
57提供用藥教育資料	

* 個案回應結果 (CC碼)

51減少門診就診次數	61仍經常去門診，沒減少就診次數
52較依指示時間服用藥品	62仍不按指示時間服用藥品
53給藥技巧更正確	63給藥技巧仍不正確
54較不會忘記服藥	64仍較會忘記服藥
55較正確使用OTC藥/保健食品	65仍不正確使用OTC藥/保健食品
56會使用促進健康/預防疾病措施	66仍不會使用促進健康/預防疾病措施
57具有較正確用藥知識	67仍沒有正確用藥知識
58使用較正確生活形態/自我照顧	68仍未改善生活形態/自我照顧
59能依醫囑正確用藥	69仍不能依醫囑正確用藥


**若有未列出之介入事項或病人結果種類，請告知藥師全聯會督導，以更新版本。

目前疾病治療控制情形 (目前療效代碼)

代碼	目前病況	描 述
7	完全治癒	病人所期望的治療目標已完全達成，且不再需要藥物治療。
6	治療已達目標，且病	病人所期望的治療目標已完全達成，且病情穩定，起伏

	情穩定	不明顯，但仍需藥物治療，以維持穩定的病情。
5	最近治療曾多次達目標，且病情穩定	病人曾多次達到所期望的治療目標，病情雖穩定，起伏不明顯，但仍在「達標」與「未達標」之間來回擺盪。此時，須強化藥物治療的品質，以期穩定達標。
4	治療偶爾達標，但病情不穩定	病人僅偶爾達到所期望的治療目標，且病情不穩定，偶有不適症狀。須強化疾病的控制，以穩定病情。
3	治療未達標，但病情穩定	病人未曾達到所期望的治療目標，且療效指標一直穩定過高，有不適症狀。此時，應再強化藥物治療的品質，以期穩定達到治療目標。
2	治療未達標，且病情不穩定	病人不但未曾達到所期望的治療目標，病情還很不穩定，常有不適症狀，起伏明顯。此時應積極強化藥物治療與疾病控制的品質，使病況朝正面發展。
1	病情糟糕，且有併發症狀	病人不但未曾達到所期望的治療目標，病情還很不穩定，起伏明顯，常有不適症狀，甚至出現疾病衍生的併發症，需其他醫療處置，以控制衍生出的併發症狀。

※前述疾病治療控制情形代碼示意圖



各種疾病/醫療問題治療效果追蹤改善情形(與之前比較，第一次訪視不寫)之類別與代碼

代碼	類別	描述
4	已解決	此時，病患所期望的治療目標已成功地達到，藥物治療可以停止了。此狀態可代表最理想的療效結果，通常在急性病或急性醫療問題上可見到此結果。此時的行為是停止用藥。慢性病很難達此目標而停藥。
3	穩定	此時，病患所期望的治療目標已達到，繼續使用相同的治療藥物。這通常是慢性病的狀況，病患檢查結果或病情穩定，但還需要使用藥物來控制住病情。仍須安排下一次追蹤時間。
2	已改善	此時，已看到正面的疾病進展，目前不需要改變藥物治療。這通常是慢性病的狀況，病患檢查結果或病情有進步，繼續使用相同藥物與劑量來控制病情。仍須安排下一次追蹤時間。
1	部份改善	此時，病患狀況有進展，但照顧計畫需要稍微調整一下，讓療效在下次追蹤時能發揮到最高點。譬如說：增加用藥劑量或改變給藥頻率。安排下次追蹤時間來觀察療效，並注意有無不良反應的出現
-1	未改善	此時，療效還沒看到明顯進展，但預期會有進展，因此繼續相同的治療。通常追蹤時間過短容易得到此結果。
-2	更糟	此時，儘管病患接受到好的照顧計畫，病患的狀況仍變壞。由於沒有達到治療目標，病患藥物治療需要改變。安排追蹤時間。
-3	失敗	此時，照顧計畫沒達到治療目標，停止現在療法，開始新治療法。安排追蹤時間。
-4	病患死亡	此時，病患在用藥期間死亡。藥師需注意是否有與藥物有關的因素與病患死亡有關，需記錄下來