

附件十二

環境用藥藥效試驗測試生物種類及條件

試驗生物	種類	中英文 學名	性別	品系	代數	年齡	測試 條件
蚊成蟲 或 及 或	白線斑蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	埃及斑蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	熱帶家蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	地下家蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
蚊幼蟲 或 及 或	白線斑蚊	○		○	<10	3-4 齡	
	埃及斑蚊	○		○	<10	3-4 齡	
	熱帶家蚊	○	雌	○	<10	3 齡末 4 齡初	
	地下家蚊	○	雌	○	<10	3 齡末 4 齡初	
蠅成蟲	普通家蠅	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	
蠅幼蟲	普通家蠅	○		○	<10	3-5 日齡	
蟑螂	美洲蟑螂	○	雌/雄	○		成蟲△	
	德國蟑螂	○	雌/雄	○		成蟲△	
跳蚤 或	貓蚤	○		○		成蟲	未吸血
	鼠蚤	○		○		成蟲	未吸血
跳蚤幼蟲 或	貓蚤	○		○		2-3 齡	
	鼠蚤	○		○		2-3 齡	
白蟻 (室內) 或	家白蟻	○		○		工蟻△	
	黑翅土白蟻	○		○		工蟻△	
螞蟻	不限種類 及品系	不限種類 及品系		○		工蟻△	
火蟻△	不限品系	不限品系					
鼠類 或	溝鼠	○	○	○	<10	成鼠 (>200g)	
	屋頂鼠	○	○	○	<10	成鼠 (>100g)	
台灣缺蠊 (小黑蚊)	○	○	雌	○			
蠊蠊幼蟲 (小黑蚊幼蟲)	○	○		○			

塵蟎	美洲室塵蟎 及 歐洲室塵蟎	○				
		○				
果蠅	黑腹果蠅	○	○	<10	成蟲1-3日齡	
蚤蠅	痘症異蚤蠅	○	○	<10	成蟲1-3日齡	
蛾蚋		○	○		成蟲或幼蟲	
臭蟲	溫帶臭蟲 或 熱帶臭蟲	○	雌/雄	○	<10	成蟲或若蟲
		○	雌/雄	○	<10	成蟲或若蟲
衣魚	絨毛衣魚 或 普通衣魚	○	雌/雄	○	<10	成蟲或若蟲
		○	雌/雄	○	<10	成蟲
書蝨	嗜書書蝨 或 穀粉茶蛀蟲	○	雌/雄	○	<10	成蟲
		○	雌/雄	○	<10	成蟲
衣蛾		○	雌/雄	○	<10	幼蟲
鱗節蟲		○	雌/雄	○	<10	末齡幼蟲
蜘蛛	壺腹蛛 或 狼蛛	○	雌/雄	○	<10	成蟲
		○	雌/雄	○	<10	成蟲
跳蟲	長角跳蟲	○	雌/雄	○	<10	成蟲或若蟲

說明：

(1)○：必備資料。

(2)△：昆蟲生長調節劑(IGR)，應使用幼蟲或若蟲。