

含 menthol、camphor、methyl salicylate 外用製劑指示藥品中文仿單修訂

指示藥品成分	修正後文字	原文字
<p>Menthol、 Camphor、 Methyl salicylate 外用製劑</p>	<p>一、含任一該等成分之所有外用劑型，除吸入劑、擦劑及滴鼻劑外，應於仿單「使用上注意事項」之「有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生」加註「2歲以下兒童」。</p> <p>二、含任一該等成分之吸入劑、擦劑及滴鼻劑，應於仿單加註「使用上注意事項」之「有下列情形者，請勿使用」加註「2歲以下之兒童」。</p> <p>三、含 methyl salicylate 之外用軟膏仿單，應於仿單： (一) 「使用上注意事項」之「有下列情形者，請勿使用」加註「曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者」。</p>	<p>一、含任一該等成分之所有外用劑型，除吸入劑、擦劑及滴鼻劑外，應於仿單加註「2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師」之注意事項。</p> <p>二、含任一該等成分之吸入劑、擦劑及滴鼻劑，應於仿單加註「嬰兒及2歲以下之兒童禁止使用」之注意事項。</p> <p>三、含 methyl salicylate 之外用軟膏仿單，應於仿單加註「methyl salicylate 之每日用量不得超過1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前請諮詢醫師或藥師」。</p>

(二) 「使用上注意事項」之「其他使用上注意事項」加註「methyl salicylate 不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師」。